

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA
**Endoscopia digestiva alta/CPRE/
Ultrassonografia endoscópica alta**

Hora de chegada: _____

Data: _____

Médico: _____

Faça o seguinte **7 DIAS ANTES** do procedimento:


Providencie um acompanhante: Durante o procedimento, você receberá medicamentos sedativos que lhe deixarão relaxado e sonolento; portanto, não é possível dirigir ou voltar para casa sozinho após o procedimento. **Você precisa que um adulto responsável o acompanhe até sua casa; caso contrário, o procedimento será cancelado ou reagendado. Sem exceções.** Informe seu acompanhante de que a consulta completa durará aproximadamente 3 horas.

Se tiver um plano de saúde gerenciado, ligue para confirmar se eles cobrirão o procedimento.

Se você estiver tomando Coumadin ou quaisquer anticoagulantes, ligue para o seu médico prescritor para receber instruções especiais sobre como interromper a medicação para o seu procedimento.

Tome seus outros medicamentos habituais normalmente, incluindo aspirinas ou analgésicos AINEs.

Se você precisar cancelar ou reagendar sua consulta, ligue para (617) 414-2600 opção n.º 1.



Faça o seguinte **2 DIAS ANTES** do procedimento:

Confirme seu acompanhante.

Faça o seguinte **NO DIA DO** seu procedimento:

Seu estômago deve estar completamente vazio para permitir um exame seguro. NÃO COMA NADA APÓS A MEIA-NOITE na noite anterior ao procedimento.

- **Você pode beber SOMENTE LÍQUIDOS CLAROS** até 2 horas antes da sua consulta, mas **NENHUM ALIMENTO SÓLIDO**. Veja abaixo a lista de líquidos claros aceitáveis.
- **Tome seus medicamentos habituais com um gole de água, especialmente seus medicamentos para a pressão sanguínea.** Traga uma lista dos medicamentos atuais.
- **Diabéticos: se você tomar insulina durante a manhã, tome metade da dose de insulina na manhã do procedimento.** Se tomar comprimidos para a diabetes, você pode pular a dose na manhã do procedimento, exceto se for instruído de outro modo. **Verifique seu nível de açúcar no sangue pela manhã, e caso estiver baixo e você se sentir débil, beba suco de maçã, bebida isotônica ou refrigerante.**
- **Confira se o seu acompanhante/motorista está disponível para buscá-lo depois do procedimento.**

Exemplos de líquidos claros que você pode tomar até 2 horas antes da sua consulta:

- Sucos de maçã ou uva branca (SEM polpa)
- Caldos claros e sem sólidos
- Chá e café SEM leite ou creme
- Refrigerantes, bebidas isotônicas, Kool-Aid, gelatinas, picolés (de qualquer cor, **menos vermelho**)



830 Harrison Ave, Boston MA 02118
2º andar do Moakley Building
Suite 2200
617-414-2600 opção 1